




# LO QUE DEBES SABER


## del Tratamiento GS-441524



### Debe realizarse un análisis de sangre cada 4 semanas

para conocer la evolución del tratamiento de su gato.

Incluya la electroforesis de proteínas en el examen de sangre para proporcionar un análisis de hígado, riñón y proteínas. Con un examen de sangre, sabríamos si la dosis es suficiente o hay que aumentarla.




### Si a su gato se le diagnostican otras afecciones y síntomas, trátelos simultáneamente.

Nuestro tratamiento es un antiviral para detener el virus de la PIF. Para la inflamación, aplique medicamentos esteroideos. Si el análisis de sangre muestra un aumento del recuento de glóbulos blancos (normalmente indica infección), aplique antibióticos. Consulte con su veterinario para mayor recomendación.



### Proporcione los siguientes suplementos:

- Ácidos grasos omega-3 (aceite de salmón o de krill).
- Protección para el hígado como Rascave Hepar, Epato Paste o Centonil.
- Vitamina B12 (gotas o inyecciones de metilcobalamina) mientras exista anemia.




### Pese a su gato una vez a la semana. En consecuencia, ajuste la dosis.

NO reduzca la dosis si el peso de su gato se reduce. Utilice la calculadora de dosis de nuestra página web para calcular la dosis semanal recomendada.



# 알아야 할 정보

## GS-441524 치료



고양이의 치료 진행 상황을 이해하기 위해 4 주마다 혈액 검사를 실시해야 합니다. 간, 신장 및 단백질 분석을 제공하기 위해 혈액 검사에 단백질 전기 영동을 포함합니다. 혈액 검사를 통해 복용량이 충분한 지 또는 증가해야 하는지 알 수 있습니다.




고양이가 염증과 다른 증상이 진단되면 동시에 치료하십시오. 우리의 치료법은 FIP 바이러스를 막는 항 바이러스제입니다. 염증의 경우 스테로이드 약물을 사용하십시오. 혈액 검사에서 백혈구 수가 증가한 것으로 나타나면 (일반적으로 감염을 나타냄) 항생제를 사용하십시오. 추가 권장 사항은 수의사에게 문의하십시오.



### 아래 보충제를 주세요.

- a) 오메가 -3 지방산 (연어 오일 또는 크릴 오일).
- b) Rascave Hepar, Hepato Paste 또는 Centonil과 같은 간 보호.
- c) 빈혈이 존재하는 한 비타민 B12 (메틸 코발라민 방울 또는 주사).



일주일에 한 번 고양이의 무게를 잹습니다. 그에 따라 복용량을 조정하십시오.

고양이의 체중이 줄었다면 복용량을 줄이지 마십시오. 우리 웹 사이트의 복용량 계산기를 사용하여 매주 권장 복용량을 계산하십시오.